

Bilaga 5 Underliggande kunskapsluckor till Top 10

Utdrag vetenskapliga kunskapsluckor till prioriterade övergripande forskningsfrågor

Listan i denna bilaga innehåller följande information:

| Tillstånd / diagnos | Typ av insats | Titel | Källa | Referens | År |
|--|---------------|-----------------------------------|--|--|---|
| Allvarlig psykisk sjukdom: psykos/ schizofreni bipolär sjukdom ätstörningar självskadebeteende svår ångest svår OCD svår PTSD svår depression suicidalitet psykiatrisk samsjuklighet | | Kunskapsluckans titel i databasen | Svensk, brittisk, eller internationell arbetsgrupp som tagit fram underlaget: <i>SBU</i> <i>Socialstyrelsen</i> <i>NICE</i> <i>Cochrane</i> <i>Evidence Update</i> <i>JLA</i> <i>DUETs Mental Health m.fl</i> | Underlag som kunskapsluckan hämtats från | År kunskapsluckan publicerades eller uppdaterates |

| TILLSTÅND (diagnos) | TYP AV INSATS | KUNSKAPSLUCKANS TITEL | KÄLLA | REFERENS | ÅR |
|--|------------------------------------|---|---|---|------|
| PRIORITÉT 1. I vilken utsträckning och hur kan man identifiera risk samt förebygga allvarliga psykiska sjukdomar och tillstånd, inklusive suicid? | | | | | |
| psykos/ schizofreni | riskidentifiering | Cognitive deficits in adolescents and young people with familial high risk or ultra high risk, and risk of transition to psychosis | Evidence Update - Psychosis and schizophrenia | <i>Bora et al. Cognitive deficits in youth with familial and clinical high risk to psychosis: a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2014; Vol.130: No. 1.</i> | 2014 |
| psykos/ schizofreni | prevention av riskindivider | Interventions for prodromal stage of psychosis | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Bosnjak Kuharic et al. Interventions for prodromal stage of psychosis. Cochrane Database of Systematic Reviews.</i> https://doi.org/10.1002/14651858.CD012236.pub2 . | 2022 |
| psykos/ schizofreni | prevention av riskindivider | Early intervention for psychosis in young people with prodromal symptoms | NICE, Mind Cymru | <i>Marshall & Rathbone. Early intervention for psychosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. Art. No.: CD004718. DOI: 10.1002/14651858.CD004718.pub3.</i> | 2011 |
| psykos/ substansbruk | riskidentifiering samsjuklighet | What risk factors predict the onset of substance misuse in young people with psychosis? | NICE Clinical Guideline | <i>National Collaborating Centre for Mental Health (2011) Psychosis with coexisting substance misuse. Clinical Guideline. London: The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists.</i> | 2011 |
| PTSD | risk-identifiering | Self-report screening instruments for post-traumatic stress disorder (PTSD) in survivors of traumatic experiences | Cochrane Depression, Anxiety and Neurosis Group | | 2013 |
| ätstörningar | prevention | Interventions for preventing eating disorders in children and adolescents | Cochrane | <i>Pratt & Woolfenden. Interventions for preventing eating disorders in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2002(2): CD002891. doi: 10.1002/14651858.CD002891.</i> | 2022 |
| självskade- beteende | prevention | Self-harm harm minimisation strategies | NICE Clinical Guideline | <i>Self-harm: assessment, management and preventing recurrence. NICE guideline [NG225] Published: 07 September 2022</i> | 2022 |

| | | | | | |
|--|-------------|---|------------------------------|--|------|
| självskade-beteende, suicid | prevention | Selekterade eller indikerade skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök | SBU | <i>SBU. Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 241. ISBN 978-91-85413-85-0.</i> | 2016 |
| Självskade-beteende | prevention | Universella skolbaserade program för att förebygga andra självskadebeteenden än suicidförsök | SBU | <i>SBU. Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 241. ISBN 978-91-85413-85-0.</i> | 2016 |
| suicid | prevention | Interventions for primary prevention of suicide in university and other post-secondary educational settings | Cochrane Injuries Group | <i>Harrod et al. Interventions for primary prevention of suicide in university and other post-secondary educational settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD009439.</i> | 2014 |
| PRIA 2. Hur kan man förbättra utredning och bedömning vid tecken på allvarliga psykiska sjukdomar och tillstånd, inkl. suicidriskbedömning och vid psykiatrisk samsjuklighet? | | | | | |
| ångest | checklistor | MINI-KID jämfört med semistrukturerad intervju, strukturerad intervju, eller LEAD som komplement till klinisk bedömning vid diagnostik av misstänkt ångest hos barn och ungdomar i specialiserad vård | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. SBU. Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt; 2012. SBU-rapport nr 212. ISBN 978-91-85413-52-2.</i> | 2020 |
| ångest | checklistor | K-SADS-PL jämfört med semistrukturerad intervju, strukturerad intervju, eller LEAD som komplement till klinisk bedömning vid diagnostik av misstänkt ångest hos barn och ungdomar i specialiserad vård | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. SBU. Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. 2012. SBU-rapport nr 212. ISBN 978-91-85413-52-2.</i> | 2020 |
| psykos/schizofreni | checklistor | Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children (K-SADS) for diagnosing schizophrenia in children and adolescents with psychotic symptoms | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Bergman et al. Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children (K-SADS) for diagnosing schizophrenia in children and adolescents with psychotic symptoms. Diagnostic Protocol, 24 June 2015.</i> | 2015 |
| ångest | checklistor | Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) som komplement till klinisk bedömning jämfört med enbart klinisk bedömning vid diagnostik av ångest hos vuxna i specialiserad vård | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018.</i> | 2020 |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|--|-----------------------------------|---|------|
| | | | | <i>SBU. Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. 2012. SBU-rapport nr 212. ISBN 978-91-85413-52-2.</i> | |
| ångest | checklistor | Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) jämfört med Longitudinal Experts All Data Procedure (LEAD) som komplement till klinisk bedömning vid diagnostik av misstänkt ångest hos vuxna i specialiserad vård | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. SBU. Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. 2012. SBU-rapport nr 212. ISBN 978-91-85413-52-2.</i> | 2020 |
| ångest | checklistor | Structured Clinical Interview for DSM Axis disorders (SCID-I) som komplement till klinisk bedömning jämfört med enbart kliniska bedömning vid diagnostik av ångest hos vuxna i specialiserad vård | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. SBU. Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. 2012. SBU-rapport nr 212. ISBN 978-91-85413-52-2.</i> | 2020 |
| depression | checklistor | Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) för att skilja mellan svårighetsgrader av depression | SBU | <i>SBU. Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) som stöd för diagnostik och bedömning av svårighetsgrad av depression. 2018. SBU-rapport nr 276. ISBN 978-91-88437-18-1.</i> | 2018 |
| självskade-beteende | risk-bedömning | Using a validated risk scale vs not using a validated risk scale for assessing people who self harm | NICE Clinical Guideline Self-harm | <i>National Collaborating Centre for Mental Health (2011) Self-harm (longer term management). Clinical Guideline. London: The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists.</i> | 2011 |
| självskade-beteende | | What are the most effective approaches to assessment of self-harm in non-specialist settings? | NICE research recommendation | <i>Self-harm: assessment, management and preventing recurrence. NICE guideline [NG225] Published: 07 September 2022</i> | 2022 |
| psykos/schizofreni | checklistor | Operational Criteria Checklist for Psychotic Illness and Affective Illness (OPCRIT+) for diagnosing schizophrenia in people with psychotic symptoms | Cochrane Schizophrenia Group | | 2014 |
| psykos/schizofreni | checklistor | First rank symptoms for schizophrenia | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Soares-Weiser et al. First rank symptoms for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD010653.</i> | 2015 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|--|---|------|
| psykos/ substansbruk | risk-bedömning | What are the prevalence, risk and protective factors, and course of illness for different combinations of psychosis and coexisting substance misuse (for example, schizophrenia and cannabis misuse or bipolar disorder and alcohol misuse)? | NICE Clinical Guideline Psychosis with coexisting substance misuse | <i>National Collaborating Centre for Mental Health (2011) Psychosis with coexisting substance misuse. Clinical Guideline. London: The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists.</i> | 2011 |
| suicid, ångest | suicidrisk- bedömning | Bedömning av suicidrisk med instrument som komplement för ungdomar och vuxna med ångest jämfört med klinisk bedömning avseende tillförlitlighet att förutsäga framtidens suicid | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2020 |
| suicid, ångest | suicidrisk- bedömning | Bedömning av suicidrisk med instrument som komplement för ungdomar och vuxna med ångest jämfört med strukturerad klinisk bedömning avseende tillförlitlighet att förutsäga framtidens suicid | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2020 |
| suicid, depression | suicidrisk- bedömning | Bedömning av suicidrisk med instrument som komplement för ungdomar och vuxna med depression jämfört med klinisk bedömning avseende tillförlitlighet att förutsäga framtidens suicid | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2020 |
| suicid, depression | suicidrisk- bedömning | Bedömning av suicidrisk med instrument som komplement för ungdomar och vuxna med depression jämfört med strukturerad klinisk bedömning avseende tillförlitlighet att förutsäga framtidens suicid | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018. SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2020 |
| suicid | suicidrisk- bedömning | Beck's Suicide Intent Scale (SIS) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |
| suicid | suicidrisk- bedömning | Edinburgh risk of repetition scale (ERRS) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid (självmord) | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |
| suicid | suicidrisk- bedömning | Implicit Association Test (IAT) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid (självmord) | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|-----|---|------|
| suicid | suicidrisk-bedömning | International Neuropsychiatric Interview (MINI-Suicidal Scale) för bedömning av risk för suicid | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |
| suicid | suicidrisk-bedömning | Manchester Self Harm Rule (MSHR) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |
| suicid | suicidrisk-bedömning | ReACT för bedömning av risk för suicid, försök till suicid | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |
| suicid | suicidrisk-bedömning | Suicide Assessment Scale (SUAS) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |
| suicid | suicidrisk-bedömning | Suicide Assessment Scale självskattningsversion (SUAS-S) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |
| suicid | suicidrisk-bedömning | Suicide Probability Scale (SPS) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |
| suicid | suicidrisk-bedömning | Södersjukhuset Self-Harm Rule (SoS-4) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |
| suicid | suicidrisk-bedömning | Patient Health Questionnaire -9 (PHQ-9) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |
| suicid | suicidrisk-bedömning | Columbia suicide severity rating scale (C-SSRS) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |
| suicid | suicidrisk-bedömning | Beck's Hopelessness scale (BHS) för bedömning av risk för suicid, försök till suicid (självmord) | SBU | <i>SBU. Instrument för bedömning av suicidrisk. 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.</i> | 2016 |
| PRIORITÉT 3. Vilka kompetenshöjande insatser riktade till personalen behövs för att förbättra vård och stöd till personer med allvarliga psykiska sjukdomar och tillstånd? | | | | | |
| Vilken kunskap och kompetens krävs vid vård av särskilda sjukdomstillstånd? | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|--|---|------|
| allvarlig psykisk sjukdom | utbildning till personal | Communication skills training for mental health professionals working with people with severe mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | | 2012 |
| psykos/schizofreni | utbildning till personal | Different communication strategies for disclosing a diagnosis of schizophrenia and related disorders | Cochrane Schizophrenia Group | | 2015 |
| allvarlig psykisk sjukdom | utbildning till personal | Does the way information is provided to patients with mental health conditions effect the outcome of treatment? | Mind Cymru | | 2007 |
| allvarlig psykisk sjukdom | utbildning till personal | Training in the use of the national quality standard and guidance on service user experience of care | NICE Clinical Guideline Service user experience in adult mental health | <i>National Collaborating Centre for Mental Health (2011) Service user experience in adult mental health. Clinical Guideline. London: The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists.</i> | 2011 |
| självskadebet eende | utbildning till personal | Training in assessment of health care staff who work with people who self-harm | NICE Clinical Guideline Self-harm (longer term management) | <i>National Collaborating Centre for Mental Health (2011) Self-harm (longer term management). Clinical Guideline. London: The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists.</i> | 2011 |
| allvarlig psykisk sjukdom | utbildning till personal | Training programme for health and social care professionals for shared decision-making | NICE Clinical Guideline Service user experience in adult mental health | <i>National Collaborating Centre for Mental Health (2011) Service user experience in adult mental health. Clinical Guideline. London: The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists.</i> | 2011 |
| psykos/substansbruk | utbildning till personal | What and how should training be provided to healthcare professionals working with people with psychosis and substance misuse? | NICE Clinical Guideline Psychosis with coexisting substance misuse | <i>National Collaborating Centre for Mental Health (2011) Psychosis with coexisting substance misuse. Clinical Guideline. London: The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists.</i> | 2011 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|--|------|
| allvarlig psykisk sjukdom | utbildning till personal | Community Mental Health Teams trained to deliver specialist treatment, compared to specialist teams (e.g., Crisis Resolution, Home Treatment, and Early Intervention) for serious mental illness | NICE research recommendation | <i>Joy et al. Crisis intervention for people with severe mental illnesses.</i> <i>Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD001087.</i> <i>Marshall & Rathbone. Early Intervention for psychosis.</i> <i>Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD004718.</i> <i>Marshall & Lockwood. Assertive community treatment for people with severe mental disorders.</i> <i>Cochrane Database of Syst Rev 1998, Issue 2. Art. No.: CD001089.</i> <i>Marshall et al. Case management for people with severe mental disorders.</i> <i>Cochrane Database of Systematic Reviews 1998, Issue 2. Art. No.: CD000050.</i> <i>Tyler et al. Community mental health teams (CMHTs) for people with severe mental illnesses and disordered personality. Cochrane Database of Syst Rev 1998, Issue 4. Art. No.: CD000270.</i> | 2007 |
| PRIORITÉT 4. Hur kan man stärka individens delaktighet i vård och stöd i samband med allvarliga psykiska sjukdomar och tillstånd? | | | | | |
| allvarlig psykisk sjukdom | patient-delaktighet | Psychological treatment versus pharmacotherapy: patient preference in the full range of psychiatric illnesses | Evidence Update - Service user experience in adult mental health | <i>McHugh et al. Patient preference for psychological vs pharmacologic treatment of psychiatric disorders: a meta-analytic review. Journal of Clinical Psychiatry 2013; Vol. 74: No. 6.</i> | 2013 |
| psykos/schizofreni | självvald inläggning | Självvald inläggning jämfört med sedvanlig vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna med tidiga tecken på återinsjuknande | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018.</i> | 2017 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|---|--|------|
| allvarlig psykisk sjukdom | framtidfullmakt | Advance treatment directives* for people with severe mental illness* "a document that specifies a person's future preferences for treatment, should he or she lose the mental ability to make treatment decisions (lose capacity)" | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Campbell & Kisely. Advance treatment directives for people with severe mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD005963.</i> | 2005 |
| psykos/ schizofreni | patientperspektiv | What is the experience for patients of drug treatments, both conventional and atypical antipsychotics, for schizophrenia? | National Institute for Health and Clinical Excellence research recommendation | | 2007 |
| psykos/ schizofreni | patientperspektiv | How satisfied are patients with schizophrenia with the drug they take for their illness | Schizophrenia Core interventions in the treatment and management of schizophrenia in primary and secondary care | | 2010 |
| allvarlig psykisk sjukdom | patientperspektiv | Do the adverse effects of antipsychotic drugs outweigh the benefits? | Mind Cymru | | 2008 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---|--|--|------|
| allvarlig psykisk sjukdom | patientperspektiv | Which adverse effects from antipsychotic drugs do patients find most difficult to cope with? | Mental Health Research Network Cymru | <i>Jayaram et al. Risperidone versus olanzapine for schizophrenia. Cochrane Syst Rev 2006, Issue 2. Art. No.: CD005237.</i> <i>Matar & AlMerie. Oral fluphenazine versus placebo for schizophrenia. Cochrane Syst Rev 2007, Issue 1.</i> <i>Joy et al. Haloperidol versus placebo for schizophrenia. Cochrane Syst Rev 2006, Issue 4.</i> <i>Duggan et al. Olanzapine for schizophrenia. Cochrane Syst Rev 2005, Issue 2.</i> <i>Lewis et al. Sertindole for schizophrenia. Cochrane Syst Rev 2005, Issue 3.</i> <i>Lonergan et al. Antipsychotics for delirium. Cochrane Syst Rev 2007, Issue 2.</i> <i>DeSilva et al. Zotepine for schizophrenia. Cochrane Syst Rev 2006, Issue 4.</i> <i>Murphy et al. Loxapine for schizophrenia. Cochrane Syst Rev 2000, Issue 1.</i> <i>Haupt DW. Differential metabolic effects of antipsychotic treatments. Eur Neuropsychopharmacol. 2006;16 Suppl 3:S149–55.</i> | 2008 |
| allvarlig psykisk sjukdom | patientperspektiv | Are side effects of antipsychotics proportional to their effectiveness? | Mind Cymru | | 2008 |
| allvarlig psykisk sjukdom | patientperspektiv | Would changes in my antipsychotic medication help my concentration improve? | Mind Cymru | | 2008 |
| Prio 5. Vilka insatser och aktiviteter inom psykiatrisk heldygnsvård är nödvändiga och mest önskvärda? | | | | | |
| allvarlig psykisk sjukdom | vårdinnehåll | Activities and occupations on inpatient mental health wards | NICE Clinical Guideline Service user experience in adult mental health | <i>National Institute for Health and Clinical Excellence (2011)</i> <i>Service user experience in adult mental health. Guideline CG136. London:</i> <i>National Institute for Health and Clinical Excellence.</i> | 2011 |

| | | | | | |
|---|-----------------|--|---|--|------|
| allvarlig psykisk sjukdom | vårdinnehåll | Length of hospitalisation for people with severe mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Babalola et al. Length of hospitalisation for people with severe mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD000384.</i> | 2014 |
| allvarlig psykisk sjukdom | implementering | Implementation of treatment guidelines for specialist mental health care | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Barbui et al. Implementation of treatment guidelines for specialist mental health care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD009780.</i> | 2014 |
| PRIO 6. Hur väl fungerar olika metoder och modeller för koordinerad vård och stöd och hur kan de göra störst nytta? (t.ex. samordning mellan olika aktörer, inklusive att följa den fysiska hälsan) | | | | | |
| psykos/ schizofreni | samordning | A co-ordinated approach of primary and secondary care in the early diagnosis and management of schizophrenia | NICE research recommendation | <i>Marshall & Rathbone. Early Intervention for psychosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD004718.</i> | 2007 |
| psykos/ schizofreni | samordning | Samordnade insatser vid förstagångsinsjuknande i psykos hos vuxna jämfört med sedvanlig vård, avseende antal dagar i arbete/studier, slutenvårdskonsumtion och livskvalitet | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018.</i> | 2018 |
| psykos/ schizofreni | arbetssätt | How can the benefits of early intervention in psychosis services be maintained once service users are discharged after 3 years? | NICE Clinical Guideline Psychosis and schizophrenia in adults in adults | <i>National Collaborating Centre for Mental Health (2014) Psychosis and schizophrenia in adults (CG178). Clinical Guideline. London: The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists.</i> | 2014 |
| psykos/ schizofreni | arbetssätt | The role of case registers in the long term management of people with schizophrenia in general practice | NICE research recommendation | | 2007 |
| allvarlig psykisk sjukdom | arbetssätt | Specialist interventions for homeless people with severe mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | | 2013 |
| psykos/ schizofreni | case management | Case management jämfört med sedvanlig vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. 2017.</i> | 2018 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|------|
| psykos/ schizofreni | case management | Mindre intensiv case management enligt mäklarmodellen och i form av personligt ombud till personer med schizofreni | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011.</i> | 2018 |
| Bipolar disorder | collaborative care | Specialised collaborative care service for people admitted to hospital with bipolar disorder | NICE Clinical Guideline Bipolar | <i>National Institute for Health and Clinical Excellence (2014). Bipolar disorder: the assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in primary and secondary care. Clinical Guideline CG185. London</i> | 2014 |
| allvarlig psykisk sjukdom | collaborative care | Collaborative care approaches for people with severe mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Reilly et al. Collaborative care approaches for people with severe mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 11. Art. No.: CD009531.</i> | 2013 |
| psykos/ schizofreni | Crisis & Outreach | Do Crisis or Outreach teams prevent relapse of psychosis? | Mind Cymru | <i>Joy et al. Crisis intervention for people with severe mental illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD001087.</i> | 2007 |
| allvarlig psykisk sjukdom | samordning | Samordnade individuella vårdplaner vid psykisk funktionsnedsättning | SBU | <i>SBU. Individuella vårdplaner. 2012. SBU:s upplysningsstjänst, publicerad 2012-11-08.</i> | 2012 |
| psykos/ schizofreni | Assertive Community Treatment | Assertive Community Treatment (ACT) jämfört med mindre intensiv case management vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna med betydande stödbehov i vardagen | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. 2017.</i> | 2018 |
| psykos/ schizofreni | Assertive Community Treatment | Assertive Community Treatment (ACT) jämfört med sedvanlig vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna med betydande stödbehov i vardagen avseende flera utfall | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. 2017.</i> | 2018 |
| allvarlig psykisk sjukdom | case management | Intensive Case Management for severe mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | | 2010 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|------|
| psykos/ schizofreni | case management | Case management enligt FACT-modellen (Flexible Assertive Community Treatment) jämfört med sedvanlig vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna | Socialstyrelsen, SBU | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018.</i> <i>SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. 2017.</i> | 2018 |
| allvarlig psykisk sjukdom | Community Mental Health Teams | Community mental health teams for people with severe mental illnesses and disordered personality | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Malone et al. Community mental health teams (CMHTs) for people with severe mental illnesses and disordered personality.</i> <i>Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD000270.</i> | 2008 |
| allvarlig psykisk sjukdom | arbetssätt | Consultation liaison in primary care for people with mental disorders | Cochrane Effective Practice and Organisation of Care | <i>Gillies et al. Consultation liaison in primary care for people with mental disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD007193.</i> | 2015 |
| psykos/ schizofreni | arbetssätt | Specialist services for people with schizophrenia | NICE Guideline on core interventions in the treatment and management of schizophrenia | <i>Shek et al. Day hospital versus outpatient care for people with schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2009 Issue 4.</i> <i>Dieterich et al. Intensive Case Management for severe mental illness.</i> <i>Cochrane Database of Systematic Reviews: Protocols 2009 Issue 3.</i> <i>Macpherson et al. Twenty-four hour care for schizophrenia.</i> <i>Cochrane Database of Systematic Reviews: Reviews 2009 Issue 2.</i> | 2010 |
| allvarlig psykisk sjukdom | arbetssätt | Compulsory community and involuntary outpatient treatment for people with severe mental disorders | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Kisely & Campbell. Compulsory community and involuntary outpatient treatment for people with severe mental disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD004408.</i> | 2010 |
| Fysisk/ somatisk hälsa | | | | | |
| allvarlig psykisk sjukdom | monitorering | Physical health care monitoring for people with serious mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Tosh et al. Physical health care monitoring for people with serious mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD008298.</i> | 2014 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|--|--|------|
| psykos/ schizofreni | monitorering | Monitoring the physical health of people with schizophrenia | NICE Guideline on Core interventions in schizophrenia | <i>Tosh et al. Physical health care monitoring for people with serious mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD008298.</i> | 2011 |
| psykos/ schizofreni | monitorering | Effective interventions for managing physical health of people with schizophrenia in general practice | NICE research recommendation | | 2007 |
| allvarlig psykisk sjukdom | monitorering | Interventions to encourage uptake of cancer screening for people with severe mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Barley et al. Interventions to encourage uptake of cancer screening for people with severe mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD009641.</i> | 2013 |
| allvarlig psykisk sjukdom | rådgivning | General physical health advice for people with serious mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Tosh et al. General physical health advice for people with serious mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD008567.</i> | 2011 |
| | rådgivning | Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna med särskild risk | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018.</i> | 2018 |
| allvarlig psykisk sjukdom | rådgivning | Oral health advice for people with serious mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Khokhar et al. Oral health advice for people with serious mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD008802.</i> | 2011 |
| allvarlig psykisk sjukdom | rådgivning | HIV prevention advice for people with serious mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Wright et al. HIV prevention advice for people with serious mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD009639.</i> | 2015 |
| | rådgivning | Kvalificerat rådgivande samtal vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna med särskild risk | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018.</i> | 2018 |
| psykos/ schizofreni | fysisk träning | Does physical exercise and activity scheduling increase well being of patients with schizophrenia? | Mental Health Research Network Cymru | <i>Beebe et al. Effects of exercise on mental and physical health parameters of persons with schizophrenia. Issues in mental health nursing, 2005, 26(6) 661-76.</i> | 2007 |

| | | | | | |
|--|----------------|--|------------------------------------|--|------|
| psykos/ schizofreni | fysisk träning | Exercise therapy for schizophrenia | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Gorcynski & Faulkner. Exercise therapy for schizophrenia.</i> <i>Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 5. Art. No.: CD004412.</i> | 2010 |
| psykos/ schizofreni | viktminskning | Interventions to reduce weight gain in schizophrenia | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Faulkner et al. Interventions to reduce weight gain in schizophrenia.</i> <i>Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD005148.</i> | 2007 |
| psykos/ schizofreni | viktminskning | Behavioural interventions for reducing weight gain in schizophrenia | Cochrane Schizophrenia Group | | |
| PRIO 7. Hur kan vård och stöd till personer med psykiatrisk samsjuklighet, inklusive beroendeproblematik, organiseras för att ha bäst effekt? | | | | | |
| psykos/ substansbruk | samordning | Psykosociala åtgärder för missbruk eller beroende samtidigt med åtgärder för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011.</i> | 2012 |
| psykos/ substansbruk | samordning | Samverkande eller integrerade team som ger samordnade behandlingar och psykosociala åtgärder för både missbruk och schizofreni | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011.</i> | 2012 |
| personlighetstörning/ substansbruk | samordning | Samordnad behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) eller psykodynamisk terapi (PDT) vid missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig personlighetsstörning | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015.</i> | 2016 |
| bipolär/ substansbruk | | Integrerad behandlingsmetod (med KBT) vid samtidigt missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och bipolär sjukdom avseende antal dagar med droganvändning per månad | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015.</i> | 2019 |
| psykos/ substansbruk | | Assertive Community Treatment (ACT) vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna med samtidigt missbruk, avseende flera utfall | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018.</i> <i>SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. 2017.</i> | 2018 |

| | | | | | |
|--|-----------------|--|---|--|------|
| psykos/ substansbruk | | Assertive Community Treatment (ACT) jämfört med mindre intensiv case management vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna med samtidigt missbruk avseende flera utfall | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018.</i> <i>SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. 2017.</i> | 2018 |
| psykos/ substansbruk | arbetssätt | Is providing treatment for psychosis and substance misuse services within staffed accommodation more cost-effective than a combination of hospital and home treatment? | NICE Clinical Guideline Psychosis with coexisting substance misuse | <i>National Collaborating Centre for Mental Health (2011)</i> <i>Psychosis with coexisting substance misuse. Clinical Guideline. London:</i> <i>The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists.</i> | 2011 |
| psykos/ substansbruk | arbetssätt | What service delivery models allow people with psychosis and coexisting substance misuse to remain living outside hospital? | NICE Clinical Guideline Psychosis with coexisting substance misuse | <i>National Collaborating Centre for Mental Health (2011)</i> <i>Psychosis with coexisting substance misuse. Clinical Guideline. London:</i> <i>The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists.</i> | 2011 |
| psykos/ substansbruk | arbetssätt | Is providing treatment for psychosis and substance misuse services within staffed accommodation more cost-effective than a combination of hospital and home treatment? | NICE Clinical Guideline Psychosis with coexisting substance misuse | <i>National Collaborating Centre for Mental Health (2011)</i> <i>Psychosis with coexisting substance misuse. Clinical Guideline. London:</i> <i>The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists.</i> | 2011 |
| allvarlig/ substansbruk | case management | Case management i form av integrerade eller samverkande team jämfört med sedvanlig vård vid missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svår psykisk sjukdom avseende substansmissbruk, psykiska symtom och livskvalitet | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015.</i> | 2015 |
| PRIO 8. Hur ges informations- och utbildningsinsatser, så kallad psykopedagogisk utbildning, på bästa sätt? (insatser som stödjer personens egna strategier för att förstå och hantera sin sjukdom) | | | | | |
| allvarlig psykisk sjukdom | psykoedukation | Psychoeducation (brief) for people with serious mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | | 2013 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------------------|--|------|
| allvarlig psykisk sjukdom | psykoedukation | Psychoeducation for siblings of people with severe mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | | 2013 |
| psykos/schizofreni | psykoedukation | Training to recognize the early signs of recurrence in schizophrenia | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Morriss et al. Training to recognise the early signs of recurrence in schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD005147.</i> | 2013 |
| psykos/schizofreni | patientutbildning | Information and communication technology in patient education and support for people with schizophrenia | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Välimäki et al. Information and communication technology in patient education and support for people with schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD007198.</i> | 2012 |
| PRIO 9. Hur ges insatser och stöd till anhöriga och närtstående på bästa sätt? | | | | | |
| bipolär | stöd till anhöriga | How can family members and carers best be supported to manage life with a person with bipolar? | JLA PSP Bipolar | <i>James Lind Alliance (2016) Priority Setting Partnership Bipolar. www.jla.nihr.ac.uk/priority-setting-partnerships/bipolar/</i> | 2016 |
| bipolär | stöd till anhöriga | How can family members and carers best support people with bipolar (through education, training and practical support)? | JLA PSP Bipolar | <i>James Lind Alliance (2016) Priority Setting Partnership Bipolar. www.jla.nihr.ac.uk/priority-setting-partnerships/bipolar/</i> | 2016 |
| suicid | stöd till anhöriga | Professionella stödinsatser till anhöriga eller andra närtstående efter suicid | SBU | <i>SBU. Stöd till anhöriga efter suicid. 2020. SBU:s Upplysningstjänst.</i> | 2020 |
| suicid | stöd till anhöriga | Krisstöd i förskola och skola vid suicid | SBU | <i>SBU. Krisstöd i förskola och skola vid suicid. 2022. SBU:s Upplysningstjänst.</i> | 2022 |

| TILLSTÅND (diagnos) | TYP AV INSATS | KUNSKAPSLUCKANS TITEL | KÄLLA | REFERENS | ÅR |
|--|------------------------|---|--------------------------------------|---|------|
| PRIORITET 10. Vilken effekt har stödinsatser inriktade på återhämtning, att minska lidande och främja möjlighet till livskvalitet som komplement till sedvanlig vård? | | | | | |
| allvarlig psykisk sjukdom | komplementära terapier | What are the effects of complementary therapies for schizophrenia? | Mental Health Research Network Cymru | <i>Ruddy & Milnes. Art therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD003728.</i> <i>Gold et al. Music therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD004025.</i> <i>Rathbone J, Xia J. Acupuncture for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD005475.</i> | 2007 |
| psykos/schizofreni | bild/ konstterapi | Bildterapi som komplement till sedvanlig vård jämfört med sedvanlig vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018.</i> <i>Schückher-Ugge & Zakrisson. Utvärdering av effekten av bildterapi. Örebro: HTA-enheten CAMTÖ; 2014.</i> | 2020 |
| psykos/schizofreni | bild/ konstterapi | Konst och hantverksterapi för behandling vid schizofreni | SBU | <i>SBU. Hantverk som terapiform till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 2015. SBU:s upplysningstjänst.</i> | 2016 |
| bipolär | bild/ konstterapi | Uttryckande konstterapi vid bipolär sjukdom | SBU | <i>SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. 2014. SBU:s upplysningstjänst.</i> | 2014 |
| PTSD | bild/ konstterapi | Bildterapi för behandling av posttraumatiskt stressymtom | CAMTÖ | <i>Schückher-Ugge & Zakrisson. Utvärdering av effekten av bildterapi, en systematisk litteraturöversikt. Örebro: HTA-enheten CAMTÖ; 2014. HTA-rapport.</i> | 2015 |
| PTSD | bild/ konstterapi | Uttryckande konstterapi vid posttraumatiskt stressyndrom | SBU | <i>SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. 2014. SBU:s upplysningstjänst.</i> | 2014 |
| självskade-beteende | bild/ konstterapi | Uttryckande konstterapi vid självskadebeteende | SBU | <i>SBU. Uttryckande konstterapi vid psykisk ohälsa. 2014. SBU:s upplysningstjänst.</i> | 2014 |

| TILLSTÅND (diagnos) | TYP AV INSATS | KUNSKAPSLUCKANS TITEL | KÄLLA | REFERENS | ÅR |
|---------------------------------|------------------|--|------------------------------------|---|------|
| psykos/ schizofreni | musikterapi | Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Geretsegger et al. Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD004025.</i> <i>Mössler et al. Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD004025.</i> | 2017 |
| psykos/ schizofreni | musikterapi | Musikterapi som komplement till sedvanlig vård jämfört med sedvanlig vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018.</i> | 2020 |
| psykos/ schizofreni | avslappningsrum | Sinnesstimulerande avslappningsrum jämfört med sedvanlig vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd | Socialstyrelsen | <i>Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018.</i> | 2018 |
| psykos/ schizofreni | trädgårdsterapi | Horticultural therapy for schizophrenia | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Liu et al. Horticultural therapy for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD009413.</i> | 2014 |
| allvarlig psykisk sjukdom | djur i vården | Animal-assisted therapy for people with serious mental illness | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Downes et al. Animal-assisted therapy for people with serious mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD010818.</i> | 2014 |
| psykos/ schizofreni | dansterapi | Dance therapy for schizophrenia | Cochrane Schizophrenia Group | <i>Ren J, Xia J. Dance therapy for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD006868.</i> | 2013 |
| psykos/ schizofreni | fysisk aktivitet | Yoga for schizophrenia | Cochrane Schizophrenia Group | | 2015 |
| psykos/ schizofreni | fysisk aktivitet | Tai chi for schizophrenia | Cochrane Schizophrenia Group | | 2015 |