

## Patientnytta, Bipolär sjukdom typ I

Effektmått	Åtgärd	Jämförelse	Resultat	Antal deltagare/ studier	Vetenskapligt underlag <sup>1</sup>
<b>SGA som tillägsbehandling (+ litium eller valproat) (vid behandling 6–24 månader)</b>					
Avbrott	Aripiprazol	Placebo	Aripiprazol inte bättre än placebo	688/2	⊕⊕○○
Återfall alla	Aripiprazol	Placebo	Aripiprazol bättre än placebo	688/2	⊕⊕⊕○
Återfall mani	Aripiprazol	Placebo	Aripiprazol bättre än placebo	688/2	⊕⊕⊕○
Återfall depression	Aripiprazol	Placebo	Aripiprazol inte bättre än placebo	688/2	⊕⊕○○
Avbrott	Quetiapin	Placebo	Quetiapin bättre än placebo	1 326/2	⊕⊕○○
Återfall alla	Quetiapin	Placebo	Quetiapin bättre än placebo	1 326/2	⊕⊕⊕○
Återfall mani	Quetiapin	Placebo	Quetiapin bättre än placebo	1 326/2	⊕⊕⊕○
Återfall depression	Quetiapin	Placebo	Quetiapin bättre än placebo	1 326/2	⊕⊕⊕○
Avbrott	Ziprasidon	Placebo	Ziprasidon bättre än placebo	238/1	⊕⊕○○
Återfall alla	Ziprasidon	Placebo	Ziprasidon bättre än placebo	238/1	⊕⊕○○
<b>SGA som monobehandling (vid behandling 12–24 månader)</b>					
Avbrott	Quetiapin	Litium	Quetiapin bättre än litium	768/1	⊕⊕○○
Återfall alla	Quetiapin	Litium	Quetiapin bättre än litium	768/1	⊕⊕○○
Återfall depression	Quetiapin	Litium	Quetiapin bättre än litium	768/1	⊕⊕○○
Återfall depression	Olanzapin	Litium/Valproat	Olanzapin inte bättre än litium/valproat	682/2	⊕⊕○○

### Otillräckligt vetenskapligt underlag

#### Bipolär sjukdom typ I

- Det föreligger otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av olanzapin och risperidon-depot som tillägsbehandling till litium eller valproat vid underhållsbehandling av personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som avbrott och återfall.
- Det föreligger otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av olanzapin i jämförelse med litium och valproat hos personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som avbrott och återfall oberoende av polaritet och återfall i mani.
- Det föreligger otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av quetiapin i jämförelse med litium hos personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som återfall i mani.

#### Bipolär sjukdom typ II

- Det föreligger otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av SGA vid underhållsbehandling av bipolär sjukdom typ 2, då det saknas studier.

<sup>1</sup> Avdrag har i tillämpliga fall gjorts på grund av studiekvalitet, överensstämmelse eller precision (se GRADE tabell 1–3 i rapporten).