

Bilaga 3

Sammanställning med bevisgradering av de granskade studierna

Bilaga 3. Sammanställning med bevisgradering av de granskade studierna.

Författare Land År	Titel	Ämnesområde	Studiedesign Material- beskrivning	Bortfall	Metod	Resultat	Bevis- grad
Logan mfl Kanada 1979	Work-site treatment of hypertension by especially trained nurses	Compliance Sjukskötarskemott Patient tillfredsställelse Program Teamarbete	Stor RCT 457 personer t-test, chi2-test	41 personer	Blodtryck, lab, EKG, hereditet, vikt, diet, rökning, avslappning, tabletträning studerades Frågeformulär	Speciältränad sjukskötarska på företag gav målbloodtryck inom 6 månader hos 94% mot 62% hos läkare och farm.compliance hos 67% mot läkares 49%. 6% av patienterna var missnöjda med att få behandling av sjuk- skötarska istället för läkare	I - 1
Hyman mfl USA 1989	The effects of relaxation training on clinical symptoms: a meta-analysis	Ikke farm beh	Metaanalys 48 studier	ej angivet	Metaanalys: exp/kontroll exp/placebo pre/posttest	Jacobson's muskelavslappning, rytmisk andring, föreställning, Lamaze, meditation, autogenetisk träning, hypnos, TM, yoga och Zen hade effekt på speciellt huvudvärk och hypertoni	I - 1
Schron mfl USA 1989	I. The systolic hyper- tension in the elderly program II.	Teambete Program II.	Stor RCT 551 personer Pilotstudie Dubbelblind placebo Stor RCT 4736 personer Dubbelblind, placebo	ej angivet	Blodtryck, lab, farmaka studerades Intervju Blodtryck, lab, EKG studerades Frågeformulär	Sjukskötarskan är blodtrycks- mätningsspecialist, EKG-tekniker och tolkare. Tränings- och cer- tifiksprogram utarbetades. Sjukskötarskan gör en bra insats vid forskningsprojekt. Medverkar med egena delstudier och nya infallsvinklar	I - 1
Devine Reitschneider USA 1995	A meta-analysis of the effects of psycho- educational care in adults with hyper- tension	Aktiv patientroll Compliance Ikke farm beh	Metaanalys 102 studier	ej angivet	Metaanalys	Signifikant effekt av psykologisk utbildning som behandling mot högt blodtryck, gav kunskap och ökad farmakologisk och åter- besöksförlämsamhet	I - 1

Bilaga 3 forts.

Författare Land År	Titel	Ämnesområde	Studiedesign Material- beskrivning	Bortfall	Metod	Resultat	Bevis- grad
Reichgott mfl USA 1983	The nurse practitioners's (NP) role in complex patient management: Hypertension	Sjukskötarskemott	Liten RCT 184 personer Student's t-test, chi2-test	ej angivet	Retrospektiv journal- granskning av blodtryck, farmaka, komplikationer, konsultationer, besöks- frekvens	Fler patienter med flera diagnoser går till NP. Av 611 besök var 72% till NP. Om högt blodtryck finns ändrar NP oftare behandling än läkare. Yngre pati- enter går företrädesvis hos NP. NP initierade sjukhusvård då så erfordrades	I - 2
Fuchs mfl Israel 1993	Comprehensive individualised non-pharmacological treatment programme for hypertension in physician-nurse clinics: two year follow-up	Teamarbete Kostnad Icke farm beh	Liten RCT 75 personer chi2-test	10 personer	Blodtryck, vikt, diet, rök- ning, fysisk aktivitet, av- slappning studerades	Farmaka minskades eller ut- sattes, vikt, blodtryck och rökning minskade och fysisk aktivitet ökade för båda grupperna. Sjukskötarskor skötte alla patient- kontakter	I - 2
Ginsberg mfl Israel 1993	Partial cost-benefit analysis of two different modes of nonpharmacological control of hypertension in the community	Teamarbete Kostnad Icke farm beh	Liten RCT 32 personer t-test	ej angivet	BMi, diet, rökning, fysisk aktivitet studerades	Teamet med läkare-sjukskötterska och det paramedicinska teamet uppnådde samma resultat. Vid 11. mån. hade 30,8% slutat med farmaka och 40% hade minskade doser. På 5 mån. sparades kost- naden in för läkare-sjukskötters- teamet	I - 2
Soghikian USA 1978	The role of nurse practitioners (NP) in hypertension care	Sjukskötarskemott Program Patient tillfredsställelse	Ikke randomiserad med samtidig kontroll 139 personer t-test	ej angivet	Journalgranskning Frågeformulär	Alla patienter nöjda, speciellt 84% föredrog att behandlas av NP istället för av läkare. På bådas mottagning var blodtryckssänk- ningarna samma. Nästan dubbelt så många besök registrerades hos NP pga vårdprogrammets utformning	II - 1

Författare Land År	Titel	Ämnesområde	Studiedesign Material- beskrivning	Bortfall	Metod	Resultat	Bevis- grad
Brennan mfl USA 1979	The Mayo Three-community hypertension control program. III. Outcome in a community based hypertension clinic	Compliance Program Sjukskötarskemott	Ikke randomiseras med samtidig kontroll 120 personer	5%	Blodtryck, ögonstatus, hjärtundersökning, vikt, hereditet, salt, diet, farmaka studerades Frågeformulär	Lägre blodtrycksvärdens hos nurse practitioner (NP) än läkare. Utmarkt acceptans, kort väntetid och lågt antal uteblivna på NP:s mottagning	II - 1
Nessiman mfl USA 1980	Increasing compliance. Patient-operated hypertension groups	Compliance Sjukskötarskemott Aktiv patientroll	Ikke randomiseras med samtidig kontroll 52 personer t-test	ej angivet	Bandinspelning. Diet, salt, blodtryck, tabletträkning, kunskaps-test av patient, återbesöksfrekvens studerades	Experimentgruppen som behandlats i grupp tog farmaka mer rätt och hade lägre blodtryck. Återbesöksfrekvensen lika mellan de icke välväntollerade hypertoniker-grupperna	II - 1
Pinkney-Atkinson mfl Sydafrika 1981	The role of the advanced clinical nurse in a hypertension clinic	Compliance Utbildning för sjuksköt Sjukskötarskemott	Ikke randomiseras med samtidig kontroll Totalundersökning 644 personer	7%	Retrospektiv journalgranskning av återbesöksfrekvens, farmaka, död	7% bortfall samma för läkare och sjukskötterska. Önskvärt att sjukskötterska får skriva vissa recept	II - 1
Ramsay mfl Kanada 1982	Physicians and nurse practitioners (NP); Do they provide equivalent care?	Compliance Sjukskötarskemott	Ikke randomiseras med samtidig kontroll 80 personer test Z	ej angivet	Retrospektiv journalgranskning av blodtryck, vikt, compliance av återbesök	Feta patienter gick ner i vikt hos NP, upp hos läkare och de uteblev från återbesök hos läkare. Signifikant lägre blodtryck uppmättes hos NP	II - 1
Berglund mfl Sverige 1986	Structured nurse-based care for hypertension - an alternative for the future	Patient tillfredsställelse Program Sjukskötarskemott	Ikke randomiseras med samtidig kontroll 3240 personer	6,3%	Blodtryck, återbesöksfrekvens Intervju Ekonominisk statistik	16% hypertontiker hittades och 73% av dessa var redan kända. 6,3% ej uppföljda. Sjukskötterskorna visade utmärkt följsamhet till programmet. Lägre personal-kostnad med sjukskötterska på blodtrycksmedtagning. Patienterna i experimentområdet hade större tilltro till sin mottagning och fick bättre information	II - 1

Bilaga 3 forts.

Författare Land År	Titel	Ämnesområde	Studiedesign Material- beskrivning	Bortfall	Metod	Resultat	Bevis- grad
Råstam mfl Sverige 1986	The Skaraborg hypertension project. II Feasibility of a medical care program for hypertension	Sjukskötarskemott Patient tillfredsställelse Program Utbildning för sjuksköt	Ikke randomiserad med samtidig kontroll Totalundersökning 3 240 personer Matchat kontroll-område Cohortindelning t-test	ej angivet	Blodtryck, hereditet, information, återbesöksfrekvens, rökring, BMI, farmaka studerades	Etablering av programmet gick fort, specifikt sedan upptäckt av att sjukskötarska kunde sköta mycket av traditionell läkarmottagning. 10 sjukskötterskor engagerades, 13% fick behandling jämfört med statistiskt uppskattat 16%. Färre patienter än förväntat behövde remitteras till specialist. Patienterna ansåg sjukskötarskan kvalificerad att råd och behandling.	II - 1
Jewell Hope England 1988	III Influence on blood pressure of a medical care program of hypertension	Sjukskötarskemott Program	Ikke randomiserad med samtidig kontroll 2 806 personer Cohortindelning t-test, chi2-test	ej angivet	Blodtryck	Blodtryckssänkning även för dem som behandlades sedan tidigare	II - 1
Adorian mfl Israel 1990	Evaluation of a nurse-run hypertension clinic in general practice	Patient tillfredsställelse Sjukskötarskemott Program	Ikke randomiserad med samtidig kontroll 36 personer t-test	2 personer	Blodtryck, puls, vikt, lab, rökring, farmaka studerades intervju	67% hos sjukskötarska och 63% hos läkare var normotensiva efter 1 år. Ingen skillnad i röksättning, viktnedgång, kunskap om farmaka, behandlingsstillsättelse eller återbesöksfrekvens	II - 1
	Group discussions with the health care team - a method of improving care of hypertension in general practice	Teamarbete Compliance	Ikke randomiserad med samtidig kontroll 40 mottagningar	ej angivet	Blodtryck, puls, vikt, lab, ödem, diet, tabletträckning studerades	20 mottagningar med läkare-sjukskötarsketeam som utbildades jämfördes med 20 andra mottagningar. På 7 år ökade andelen behandlade personer från 4 till 9,2% i första gruppen (bortfall 2,3-3,1%), och i den andra var 5,9% behandlade (bortfall 9,8%)	II - 1

Författare Land År	Titel	Ämnesområde	Studiedesign Material- beskrivning	Bortfall	Metod	Resultat	Bevis- grad
Curzio mfl Skottland 1990	A comparison of the management of hypertensive patients by nurse practitioners (NP) compared with conventional hospital care	Compliance Sjukskötarskemott Program Teamarbete	Ikke randomiserad med samtidig kontroll 396 personer Matchad kontrollgrupp t-test	31% hos NP 65% hos läkare	Prospektiv journalgranskning av blodtryck, vikt, etyl, lab, rökrökning, EKG, compliance av farmaka, diet och mortalitet efter 6 år	Större blodtryckssänkning, färre farmakabehandlade och större compliance för återbesök hos NP. Litet viksräkning för fetta hos NP. Ingen skillnad i mortalitet och lab-data för grupperna	II - 1
Dierassi mfl Israel 1990	Comparison of hypertension treatment on and of the worksite	Teamarbete Compliance	Ikke randomiserad med samtidig kontroll 249 personer t-test	9 personer	Blodtryck, puls, vikt, lab, ödem, diet, tabletträkning studerades	Anställda hypertoniker på fabrik A behandlades av ett läkare-sjukskötarsketeam och anställda på fabrik B behandlades av familjeläkare. På fabrik A var 83,7% och på fabrik B 24,1% väl-inställda. I grupp A kom 100% och i grupp B kom 62% på återbesök efter 1 år	II - 1
Basset mfl Zimbabwe 1990	Hypertension control in Harare municipal clinics	Compliance Sjukskötarskemott	Randomiserad med historisk kontroll 437 personer Student's t-test, chi2-test	1/3 på 6 år	Retrospektiv journalgranskning av blodtryck, behandling, återbesök och farmaka	Sjukskötarkor kan sköta stabila hypertoniker tillfredsställande, men 1/3 bortfall under 6 år	II - 1
Erickson Swain USA 1990	Mobilizing self-care resources: A nursing intervention for hypertension	Aktiv patientroll Ikke farm beh	Ikke randomiserad med samtidig kontroll 20 personer Matchad kontrollgrupp Validitetsmätning	ej angivet	Blodtryck studerades Frågeformulär	Blodtrycket sjönk 24/23 mm Hg i expgruppen och 8/5 i kontrollgruppen av behandling enligt personcentrad holistisk härlinng. Experimentgruppen var efter 6 mån. glädare, mindre spända och ängsliga. Energiflödet för att klara det dagliga livet stannade av från andra subsystem	II - 1

Bilaga 3 forts.

Författare Land År	Titel	Ämnesområde	Studiedesign Material- beskrivning	Bortfall	Metod	Resultat	Bevis- grad
Carlberg Tibbin Sverige 1992	Patient satisfaction in primary health care. A comparative study of two modes of treatment for hypertension	Teamarbete Patient tillfredsställelse Icke farm beh	Icke randomiserad med samtidig kontroll 174 personer Matchad kontroll- grupp chi2-test	ej angivet	Blodtryck studerades Frågeformulär med VAS-skala	Icke farm beh är mer nöjda och tror sig ha höjt hälsostatus, har positiv attityd till hypertoni och hälsovård, är nöjd med att sluta farmakabehandling och har mindre oro	II - 1
Woolard m fl Australien 1995	A controlled trial of nurse counselling on lifestyle change for hypertensives treated in general practice: preliminary results	Sjuksköterskemott Icke farm beh	Icke randomiserad med samtidig kontroll 166 personer t-test, chi2-test	ej angivet	Blodtryck, vikt, salt, diet, räkning, fysisk aktivitet, etyl studerades	Blodtrycken sjönk 6/5 mm Hg. Etylkonsumtion, saltintag och vikt gick ner	I - 1
Cullen m fl Australien 1976	Community control of hypertension	Teamarbete	Icke randomiserad med historisk kontroll 3715 personer Totalundersökning	ej angivet	Blodtryck, längd, vikt, lab studerades Frågeformulär	Efter att sjuksköterska tillträtt, nya farmaka introducerats och patienterna fått mer information ökade andelen hypertoniker under kontroll från 70 till 87% på 3 år	II - 2
Rosenfeld Silverberg Israel 1979	Status of hypertension treatment in Israel	Teamarbete Compliance	Icke randomiserad med historisk kontroll Totalundersökning 726 personer	1%	Journalgranskning	Välkontrollerade hypertoniker ökade från 39 till 72% efter att en sjuksköterska tillträtt på mot- tagning. Återbesöksfrekvensen steg från 70 till 99%. Sjuksköterska kan ta längre tid för att förklara om sjukdom, far- maka, diet och uppmuntra. Psyko- logiska problem och biverkningar observeras av sjuksköterskan	II - 2
Hill Reichgott USA 1979	Achievement of standards for quality care of hypertension by physician and nurses	Teamarbete Sjuksköterskemott	Kvastexperimentell med randomiserat material 200 personer chi2-test	ej angivet	Retrospektiv journalgranskning av blodtryck, farmaka, biverk- ningar, lab, komplikationer, åter- besöksfrekvens	70% av de komplicerade hyper- tonikerna behandlades av läkare. Sjuksköterskor och läkare gav annars lika bra vård	II - 2

Författare Land År	Titel	Ämnesområde	Studiedesign Material- beskrivning	Bortfall	Metod	Resultat	Bevis- grad
Watkins Wagner USA 1982	Nurse practitioner and physician adherence to standing orders criteria for consultation or referral	Sjuksköterskemott Program	Kvasiexperimentell med randomiserat material 402 personer Variansanalys t-test, chi2-test	ej angivet	Journalgranskning av blodtryck, besöksstatistik, lab, farmaka, dietet, vikt, sjuksköterskas remittering till eller konsulta- tion av läkare	Sjuksköterska konsulterar inte läkare i 33% av fallen (nest kvinnor) när enligt kriterierna skulle ha gjort så. Ett problem eller kriterierna för striktar?	II - 2
Rubin mfl Skottland 1984	Preliminary experience with a hospital blood pressure follow up with nurse practitioner assessment and microprocessor based data retrieval	Teamarbete Program Sjuksköterskemott	Icke randomiserad med historisk kontroll Totalundersökning 376 personer	16 personer	Blodtryck, röknings, diet, farmaka studerades Intervju	Datorbaserat journalsystem möjliggör mer effektiv uppföljning av stora patientgrupper. År acceptabelt för patienten. 17% var icke farm beh och 81% farm beh. 10% bortfall hos NP jämfört med 19% på sjukhusmott. >70% välväktorerade efter 2 år	II - 2
Lindholm Sverige 1984	Efficacy of a district nurse programme in the follow-up of hypertensives	Teamarbete Compliance Program	Icke randomiserad med historisk kontroll Totalundersökning 229 personer t-test, chi2-test	15-20%	Journalgranskning av blodtryck, lab	Journalgranskning av blodtryck, lab Totalundersökning 46 909 personer	II - 2
Silverberg mfl Israel 1985	A national programme of hypertension control using a doctor-nurse team approach: the Israel experience	Teamarbete Compliance Program Utbildning för sjukskö	Icke randomiserad med historisk kontroll Totalundersökning 46 909 personer	2%	Journalgranskning av blodtryck, ätterbesöksfrekvens, vikt, lab, farmaka	Diastoliska trycket lägre, bort- fallet ner från 30% till 2% på 6 år, fler hypertoniker upptäcks, väntiden till mottagning kortare och 3/4 av hypertonikerna är under kontroll	II - 2

Bilaga 3 forts.

Författare Land År	Titel	Ämnesområde	Studiedesign Material- beskrivning	Bortfall	Metod	Resultat	Bevis- grad
Robb mfl USA 1986	Work designs: nurse-managed hypertension care	Utbildning för sjuksköt Program	Icke randomiserad med historisk kontroll Totalundersökning 549 personer	231 personer	Enkät	26% av de tillfrågade sjuksköters- skorna hade inte haft hypertoni- program före utbildningen med workshops och 7,5% hade fort- farande inget. 69,5% hade ut- vecklat eller förbättrat sitt pro- gram. Hindrar för utveckling främst vara svårighet att motivera patient- erna för behandling	II - 2
Curzio mfl Skottland 1987	Risk factor modifica- tion in hypertension - success and failure	Sjuksköterskemott Compliance Icke farm beh	Icke randomiserad med historisk kontroll 247 personer Totalundersökning	72 personer	Blodtryck, diet röknings, vikt, lab, fysisk undersöking, EKG studierades	51% uppnådde målblodtryck eller lägre, ingen skillnad i vikt, men 15 av 65 personer slutade röka vid nurse practitioners mottagning vid 4-årsuppföljning. 16 patienter uteblev från återbesök	II - 2
Abel mfl USA 1994	Managing hyperten- sion among veterans in an outpatient screening program	Teamarbete Icke farm beh	Kvasiexperimentell med randomiserat material 212 personer t-test	5 personer	Retrospektiv journal- och protokollsgranskning av blod- tryck, vikt, fysisk aktivitet, salt- intag, etyl, avslappning, röknings intervju	Icke farm beh gav: färre åter- besök, lägre medelblodtryck, yngre med mättlig övervikt ingen förändring, större etylkonsumtion och mera fysisk aktivitet. Farm beh gav mera fysisk aktivitet men ingen viktförändring	II - 2
Pheley mfl USA 1995	Evaluation of a nurse- based hypertension management program: Screening, manage- ment, and outcomes	Compliance Program Sjuksköterskemott Icke farm beh Kostnader	Icke randomiserad med historisk kontroll 415 personer t-test kohort	ej angivet	Journalgranskning av blodtryck, icke farm beh och compliance av tabletintag	Upprepade mätningar utvisar fler friska personer, vilket sparar pengar för onodig farmaka. Pro- gram sänkte blodtryck	II - 2
Kennedy USA 1975	Managing the hyper- tensive patient: Report of a study	Aktiv patienttroll Sjuksköterskemott	Deskriptiv kvasi- experimentell 175 personer chi2-test	ej angivet	Blodtryck studerades. Intervju om sjukdomskunskap, farmaka, diet	Patienterna på sjuksköterske- bemannat sjukhus hade högre kunskap och lägre diastoliskt blodtryck än patienter på läkar- bemannat sjukhus. De hade också oftare fått broschyr och information om hypertoni	III

Författare Land År	Titel	Ämnesområde	Studiedesign Material- beskrivning	Bortfall	Metod	Resultat	Bevis- grad
Clark Dunn USA 1976	A nurse clinician's role in the management of hypertension	Teamarbete Sjukskötarskemott	Deskriktiv kvasiexp 43 personer	11 personer	Blodtryck, lab, vikt, biverkningar, diet studerades	Ingen speciell viktändring. Tillfredsställande blodtryck för 20 av de 32 hypertonikerna när sjukskötterska följe ett strikt protokoll med randomiserat givna läkemedel	III
McLaughlin m fl USA 1979	Nurses' and physicians' performance on clinical simulation test: Hypertension	Sjukskötarskemott Utbildning för sjuksköt	Deskriktiv kvasiexp 133 personer Matchad Reliabilitets- och validitetsmätning chi2-test	ej angivet	Skriftlig test av Sjukskötterskors kunskap bedömd av expertpanel	Sjukskötterskor har en mera psykosocial modell i sitt arbete. Sjukskötterskor behandlar och bedömer generellt hypertoniker likaså bra som läkare gör	III
Powers Woodridge USA 1982	Factors influencing knowledge, attitudes, and compliance of hypertensive patients	Aktiv patientroll Compliance	Deskriktiv kvasiexp 160 personer Validitetstest t-test	ej angivet	3 mätfällen Kunskap om etiologi, symptom, farmaka, blodtryck studerades. Sjukskötterska berättade om patientens måluppfyllelse	Kunskap och compliance av farmaka ökade. Inget av utbild- ningsräten som användes av sjukskötterskor gav bättre resultat än annat	III
Carlgren m fl Sverige 1986	Ersätter en distrikts- skötterska en distrikts läkare när det gäller behandling och kont- roll av okomplicerat högt blodtryck? Utvärdering av blod- trycksmottagning vid Hedemora Värdcentral	Patient tillfredsställelse Sjukskötarskemott	Deskriktiv kvasiexp perimentell 98 personer Totalundersökning	7%	Enkät	Patienten upplever att distrikts- skötterskan ger vård av samma kvalitet som läkare	III
Pearce m fl USA 1989	Behavioral treatment of isolated systolic hypertension in the elderly	Aktiv patientroll Icke farm beh	Deskriktiv kvasiexp Pilotstudie 15 personer	ej angivet	Blodtryck, mätning i hemmet studerades	Kontinuerlig blodtryckssänkning över kontrollperioden, feedback- behandlingsperioden och av- slappningsperioden: 13/5 mm Hg hemma och 8/6 mm Hg på mottagning	III

Bilaga 3 forts.

Författare Land År	Titel	Ämnesområde	Studiedesign Material- beskrivning	Bortfall	Metod	Resultat	Bevis- grad
Johannesson m fl Sverige 1991	Cost-benefit analysis of nonpharmacological treatment of hypertension	Kostnad	Deskriptiv kvasiexp 400 personer	ej angivet	Blodtryck, diet, fysisk aktivitet, avslappning, farmakabiverkning studerades. Kostnadsanalys	Behandlingskostnaden högre för icke farm beh även sedan farmakakostnader räknats ifrån	II
Johnson USA 1993	Nurse practitioner-patient discourse: Uncovering the voice of nursing in primary care practice	Teamarbete Sjukskötarskemott	Kvalitativ Samtals- och etnografisk analys 3 personer	ej angivet	Bandinspelning Intervju med sjuksköterskor	Sjuksköterskan skicklig i att få samförstånd med patienten. Utför preventiva åtgärder och är tolk för läkaren. Sjuksköterskor konsulterar varandra	II