

Tillstånd: Gravid i förlossningens aktiva fas

Åtgärd: Kontinuerligt professionellt stöd av barnmorska från förlossningens aktiva del och till dess att födseln är över

Socialstyrelsens bedömning

Det saknas publicerade vetenskapliga studier som innehåller en analys av kostnadseffektiviteten av kontinuerligt professionellt stöd av barnmorska från förlossningens aktiva del och till dess att födseln är över jämfört med sedvanlig rutin.

Slutsatsen bygger på resultatet av en systematisk litteratursökning efter hälsoekonomiska studier på området.

Underlag för bedömningen

I den systematiska litteratursökningen identifierades ingen hälsoekonomisk studie som uppfyllde inklusionskriterierna.

Förlossningens aktiva del karakteriseras av regelbundna, smärtsamma sammandragningar i kombination med att modermunnen är öppen minst 5 cm eller att livmoderhalsen är utplånad och modermunnen öppen 1 cm. Den aktiva fasen kan gå snabbt, men kan också pågå i flera timmar. Om kontinuerligt professionellt stöd innebär att den födande inte får lämnas ensam under en längre stund, kommer bemanningen på en förlossningsavdelning troligen att behöva öka. I hur stor utsträckning det finns behov av att öka bemanningen beror på om barnmorskan kan utföra andra uppgifter samtidigt som hen stöttar den födande under den aktiva fasen eller inte. Till exempel att undersöka kvinnor som får gå hem då de inte är i aktivt förlossningsarbete, eller assistera en annan barnmorska under krystskedet och efterbördsskedet.

Det vetenskapliga underlaget, som studerat effekter av kontinuerligt professionellt stöd av barnmorska från förlossningens aktiva del och till dess att födseln är över jämfört med sedvanlig rutin, fann inga säkerställda skillnader i risk för negativa utfall hos foster/barn och gravid/moder, eller så går effekten inte att bedöma. Underlaget visade dock, med låg tillförlitlighet, att fler kvinnor är nöjda med kontinuerligt stöd jämfört med sedvanlig rutin.

Litteratursökning

En separat litteratursökning efter hälsoekonomiska studier genomfördes. I sökningen identifierades totalt 104 artikelsammanfattningar som granskades av en projektledare och en hälsoekonom som sorterade fram en potentiellt relevant hälsoekonomisk artikel [1]. Vid granskning i fulltext visade sig jämförelsealternativet i studien inte vara relevant för frågeställningen.

Granskade hälsoekonomiska studier

Granskade och inkluderade artiklar	Antal
Artiklar som lästes på titel-/abstraktnivå	104 artiklar
Artiklar som lästes i fulltext	1
Artiklar som kvalitetsgranskades	0
Artiklar som inkluderades i underlaget	0

Exkluderade hälsoekonomiska studier, efter fulltextgranskning

Exkluderade artiklar efter fulltextgranskning	Orsak till exklusion
Kashanian, et al., 2010, [1]	Ej relevant C

Referenser

1. Kashanian M, Javadi F, Haghighi MM. Effect of continuous support during labor on duration of labor and rate of cesarean delivery. *Int J Gynaecol Obstet.* 2010;109(3):198-200. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2009.11.028>.