



Bilaga 2.3

1 (27)

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020
- insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa,
inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
rapport 335 (2021)

Bilaga 2.3 Läkemedel

Utdrag från SBU:s databas med vetenskapliga kunskapsluckor

Listan i denna bilaga innehåller följande information:

| Populations-kategori | Titel | Insats-kategori | Källa (endast i DUETs) | Referens | Typ av kunskapslucka | Datum |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| Övergripande kategori för population | Kunskaps-luckans titel | Övergripande kategori för insats | Internationell eller brittisk arbetsgrupp som tagit fram underlaget (t.ex. Cochrane, NICE, JLA, DUETs Mental Health Module editorial group) | Underlag som kunskaps-luckan hämtats från | Tre typer: - En systematisk översikt behövs - En uppdaterad systematisk översikt behövs - Fler primärstudier behövs De tre typerna återspeglar kunskapsläget sådant det såg ut vid tidpunkten för utredningen av kunskapsluckan. | Datum för när den senaste versionen av kunskaps-luckan publicerades |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|-----------------------------|--|---|---------------------------|---|------------|
| Neuropsykiatriska tillstånd | Centralstimulerande läkemedel (CS) vid ADHD hos barn avseende substansmissbruk/-beroende senare i livet - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i> | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-27 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Atomoxetin vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/-beroende | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-27 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Metylfenidat vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/-beroende - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i> | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-27 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Atomoxetin i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/beroende | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-27 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Atomoxetin i kombination med motiverande samtal vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/-beroende | Läkemedel, Stöd & Information | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-27 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Metylfenidat i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid behandling av personer med ADHD som samtidigt har ett substansmissbruk/-beroende | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-27 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Multimodal behandlingsinsats med beteendeterapi kombinerat med läkemedel jämfört med endast beteendeterapi vid behandling av ADHD - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i> | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-26 |

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|-----------------------------|--|---|---------------------------|---|------------|
| Neuropsykiatriska tillstånd | Multimodal behandlingsinsats med beteendeterapi kombinerat med läkemedel jämfört med endast läkemedelsbehandling vid behandling av ADHD - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i> | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-26 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Metylfenidat jämfört med atomoxetin vid behandling av ADHD hos barn - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i> | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-26 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Kognitiv beteendeterapi som tillägg till läkemedelsbehandling jämfört med endast läkemedel hos vuxna med ADHD | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-25 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Atomoxetin jämfört med metylfenidat vid ADHD hos vuxna - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i> | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-25 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med atomoxetin vid ADHD hos barn | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-25 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med metylfenidat vid ADHD hos barn | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-25 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med metylfenidat vid ADHD hos vuxna | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-25 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|-----------------------------|--|---|---|--|------------|
| Neuropsykiatriska tillstånd | Långtidsbehandling (6 månader eller mer) med atomoxetin vid ADHD hos vuxna | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 217. ISBN 978-91-85413-58-4. | 2014-02-25 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Centralstimulerande ADHD-läkemedel i kombination med smärtstillande opioider hos patienter med ADHD samt långvarig smärta avseende risken att utveckla missbruk | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | SBU. Finns risk för missbruk vid samtidig behandling med ADHD läkemedel och smärtstillande opioider? Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2014-08-21. | 2015-02-13 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Melatonin som behandling av sömnproblem hos barn med ADHD - <i>Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod</i> | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | SBU. Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD? Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU:s upplysningstjänst, publicerad, 2013-03-27. | 2013-11-04 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Risperidon vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 215. ISBN 978-91-85413-54-6. | 2014-02-25 |
| Neuropsykiatriska tillstånd | Kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med risperidon jämfört med enbart risperidon vid autismspektrumtillstånd (AST) | Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport nr 215. ISBN 978-91-85413-54-6. | 2014-02-25 |
| Affektiva tillstånd | Ketamin som infusionsbehandling jämfört med placebo eller annan behandling vid bipolär sjukdom hos vuxna | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | Informationen är hämtad från SBU Kommenterar: Ketamin vid svårbehandlad depression. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Kommenterar nr 2017:01. | 2020-03-30 |
| Affektiva tillstånd | Quetiapin i jämförelse med litium hos personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som återfall i mani | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU Alert-rapport nr 2015-02. ISSN 1652-7151. | 2016-08-08 |
| Affektiva tillstånd | Olanzapin i jämförelse med litium och valproat hos personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som avbrott och återfall oberoende av polaritet och återfall i mani | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU Alert-rapport nr 2015-02. ISSN 1652-7151. | 2016-08-08 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|--|---|---------------------------|---|------------|
| Affektiva tillstånd | Andra generationens antipsykotiska läkemedel (SGA) vid underhållsbehandling av bipolär sjukdom typ 2 | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU Alert-rapport nr 2015-02. ISSN 1652-7151. | 2016-08-08 |
| Affektiva tillstånd | Olanzapin och risperidon-depot som tilläggsbehandling till litium eller valproat vid underhållsbehandling av personer med bipolär sjukdom typ 1, mätt som avbrott eller återfall | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU Alert-rapport nr 2015-02. ISSN 1652-7151. | 2016-08-08 |
| Affektiva tillstånd | Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med andra antidepressiva läkemedel vid depression hos personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-26 |
| Affektiva tillstånd | Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-26 |
| Affektiva tillstånd | Venlafaxin jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-26 |
| Affektiva tillstånd | Vortioxetin jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-26 |
| Affektiva tillstånd | Reboxetin jämfört med imipramin vid depression hos personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-25 |
| Affektiva tillstånd | Kombinationsbehandling vid depression hos personer över 65 år | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-25 |
| Affektiva tillstånd | Agomelatin jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-23 |

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|--|----------------|---------------------------|---|------------|
| Affektiva tillstånd | Antidepressiva läkemedel jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år med Alzheimers sjukdom | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-23 |
| Affektiva tillstånd | Bupropion jämfört med placebo vid depression hos personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-23 |
| Affektiva tillstånd | Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med andra antidepressiva läkemedel vid depression hos sköra äldre personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-19 |
| Affektiva tillstånd | Reboxetin jämfört med imipramin vid depression hos sköra äldre personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-19 |
| Affektiva tillstånd | Agomelatin jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-19 |
| Affektiva tillstånd | Bupropion jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-19 |
| Affektiva tillstånd | Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-19 |
| Affektiva tillstånd | Venlafaxin jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-19 |
| Affektiva tillstånd | Vortioxetin jämfört med placebo vid depression hos sköra äldre personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-19 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|--|---|---|--|------------|
| Affektiva tillstånd | Kombinationsbehandling vid depression hos sköra äldre personer över 65 år | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-19 |
| Affektiva tillstånd | Ketamin som intravenös infusionsbehandling jämfört med annat läkemedel vid svår depression hos vuxna avseende effekter vid upprepade infusioner, långtidseffekter samt suicid/suicidförsök | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | Informationen är hämtad från SBU Kommenterar: Ketamin vid svårbehandlad depression. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Kommenterar nr 2017:01. | 2020-03-30 |
| Affektiva tillstånd | Ketamin som intravenös infusionsbehandling jämfört med elektrokonvulsiv behandling (ECT) vid svår depression hos vuxna | Läkemedel, Medicinteknik & Kirurgi | En uppdaterad systematisk översikt behövs | Informationen är hämtad från SBU Kommenterar: Ketamin vid svårbehandlad depression. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Kommenterar nr 2017:01. | 2020-03-30 |
| Affektiva tillstånd | Ketamin som intravenös infusionsbehandling jämfört med placebo vid svår depression hos vuxna avseende effekter vid upprepade infusioner, långtidseffekter samt suicid/suicidförsök | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | Informationen är hämtad från SBU Kommenterar: Ketamin vid svårbehandlad depression. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Kommenterar nr 2017:01. | 2020-03-30 |
| Affektiva tillstånd | Intravenös tillförsel av klomipramin vid djup depression | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. | 2013-11-08 |
| Affektiva tillstånd | Sömndeprivation jämfört med läkemedelsbehandling vid depression (inklusive bipolär depression) | Fysioterapi & Fysisk aktivitet, Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Ioannou M, Greenbrook JTV, Larson T, Magnusson K, Schmitz L, Sjögren P, Stadig I, Steingrimsson S, Svensson M, Szábo Z, Wartenberg C. Efficacy of sleep deprivation in patients with depression including bipolar depression [Effekter av sömndeprivation som behandling vid depression (inklusive bipolär depression)]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2019. Regional activity based HTA 2019:110. | 2020-04-16 |
| Affektiva tillstånd | Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) upp till 1 års tid, jämfört med placebo, vid depressiv episod i remission hos personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-31 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| Affektiva tillstånd | Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) upp till 1 års tid, jämfört med placebo, vid depressiv episod i remission hos sköra äldre personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-31 |
| Affektiva tillstånd | Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i mer än ett år, jämfört med placebo, vid depressiv episod i remission hos personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-31 |
| Affektiva tillstånd | Underhållsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i mer än ett år, jämfört med placebo, vid depressiv episod i remission hos sköra äldre personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-31 |
| Affektiva tillstånd | Kombinationsbehandling av antidepressiva läkemedel med samtidig insättning av kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med enbart antidepressiva läkemedel för vuxna med dystymi | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 67. | 2020-03-02 |
| Affektiva tillstånd | Tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA) jämfört med placebo för barn och ungdomar med långvarig lindrig till medelsvår egentlig depression avseende suicidbenägenhet | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 24. | 2020-03-02 |
| Affektiva tillstånd | Sertralin jämfört med placebo för barn och ungdomar med medelsvår till svår egentlig depression avseende remission, självskattade symtom och livskvalitet | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 27b. | 2020-02-07 |
| Affektiva tillstånd | Kombinationsbehandling med antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med enbart KBT för barn och ungdomar med medelsvår till svår egentlig depression avseende remission, självskattade symtom, funktionsförmåga, och avbrytande av behandling | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 29. | 2020-02-10 |

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|---|---|---------------------------|--|------------|
| Affektiva tillstånd | Kognitiv beteendeterapi (KBT) som tillägg till antidepressiva läkemedel jämfört med enbart läkemedel för ungdomar med behandlingsresistent medelsvår till svår egentlig depression avseende suicidbenägenhet | Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 30. | 2020-02-10 |
| Affektiva tillstånd | Interpersonell psykoterapi (IPT) jämfört med sedvanlig behandling, KBT, antidepressiva läkemedel eller placebo för vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression avseende långtidseffekter, biverkningar eller oönskade effekter | Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 69. | 2020-02-10 |
| Affektiva tillstånd | Psykodynamisk korttidsterapi (korttids-PDT) jämfört med sedvanlig behandling, placebo eller antidepressiva läkemedel för vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression | Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 70. | 2020-03-02 |
| Affektiva tillstånd | Kombinationsbehandling av antidepressiva läkemedel med samtidig psykologisk behandling (KBT, IPT eller PDT) jämfört med enbart antidepressiva läkemedel för vuxna med svår egentlig depression | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 84. | 2020-02-28 |
| Affektiva tillstånd | Elektrokonvulsiv behandling (ECT) jämfört med placebo, antidepressiva läkemedel eller annan behandling vid svår egentlig depression hos vuxna avseende återinsjuknande och minnesproblem | Medicinteknik & Kirurgi, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 85. | 2020-02-11 |
| Affektiva tillstånd | Återfallsförebyggande elektrokonvulsiv behandling (ECT) jämfört med enbart läkemedelsbehandling vid recidiverande egentlig depression i remission hos vuxna | Medicinteknik & Kirurgi, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 89. | 2020-02-28 |
| Affektiva tillstånd | Litium som tillägg till antidepressiva läkemedel jämfört med trijodtyronin för vuxna med behandlingsresistent svår egentlig depression | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 81. | 2020-02-28 |

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|--|---|---------------------------|---|------------|
| Affektiva tillstånd | Esketamin som tillägg till antidepressivt läkemedel vid medelsvår till svår, behandlingsresistent, egentlig depression hos vuxna | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (översyn 2020), rad 79. | 2021-05-12 |
| Affektiva tillstånd | Duloxetin jämfört med placebo vid återkommande depressioner hos personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturoversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-31 |
| Affektiva tillstånd | Duloxetin jämfört med placebo vid återkommande depressioner hos sköra äldre personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturoversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-31 |
| Affektiva tillstånd | Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) för vuxna med paniksyndrom avseende respons, remission, oönskade effekter och långtidseffekter | Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 105. | 2020-02-11 |
| Affektiva tillstånd | Antibiotika jämfört med placebo vid PANS/PANDAS hos barn och ungdomar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 54. | 2020-03-02 |
| Affektiva tillstånd | Intravenöst immunoglobulin jämfört med placebo vid svår PANS/PANDAS hos barn och ungdomar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 55. | 2020-03-02 |
| Affektiva tillstånd | Antibiotika som profylax jämfört med placebo vid PANS/PANDAS hos barn och ungdomar | Läkemedel, Prevention | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 56. | 2020-03-02 |
| Affektiva tillstånd | Kombinationsbehandling med traumafokuserad kognitiv beteendeterapi med exponering (TF-KBT) och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med TF-KBT och läkemedelsplacebo, enbart KBT eller enbart SSRI för vuxna med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 134. | 2020-02-14 |
| Affektiva tillstånd | SSRI-preparat jämfört med placebo för barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 42. | 2020-02-05 |

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|--|---|---------------------------|---|------------|
| Affektiva tillstånd | Kombinationsbehandling med monoaminoxidashämmare (MAOI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med enbart KBT för vuxna med social fobi | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 119. | 2020-02-14 |
| Affektiva tillstånd | Kombinationsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med läkemedelsplacebo för barn och ungdomar med medelsvårt till svårt tvångssyndrom (OCD) | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 52. | 2020-03-02 |
| Affektiva tillstånd | Kombinationsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med KBT för barn och ungdomar med medelsvårt till svårt tvångssyndrom (OCD) avseende respons, livskvalitet, oönskade effekter och långtidseffekter | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 52. | 2020-02-10 |
| Affektiva tillstånd | Kombinationsbehandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med enbart SSRI för barn och ungdomar med medelsvårt till svårt tvångssyndrom (OCD) avseende remission, livskvalitet, oönskade effekter och långtidseffekter | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 52. | 2020-02-10 |
| Affektiva tillstånd | Antipsykotiskt läkemedel som tillägg till selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med enbart SSRI för barn och ungdomar med svårt tvångssyndrom (OCD) | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 53. | 2020-03-02 |
| Affektiva tillstånd | Hydroxizin jämfört med placebo för vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) avseende långtidseffekter | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 100. | 2020-02-10 |
| Affektiva tillstånd | Pregabalin jämfört med placebo för vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) avseende långtidseffekter | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 101. | 2020-02-11 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| Affektiva tillstånd | Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med läkemedel för vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) | Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 95. | 2020-02-28 |
| Affektiva tillstånd | Antidepressiva läkemedel jämfört med placebo för vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) avseende funktionsnivå och långtidseffekter | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 98. | 2020-02-10 |
| Affektiva tillstånd | Kognitiv beteendeterapi (KBT) jämfört med läkemedelsplacebo för vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) | Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2018, rad 95. | 2020-02-28 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Samordnade insatser vid förstagångsinsjuknande i psykos hos vuxna jämfört med sedvanlig vård, avseende antal dagar i arbete/studier, slutenvårdskonsumtion och livskvalitet | Organisation, Stöd & Information, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 46. | 2020-03-05 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Aripiprazol jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 1. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213. | 2020-03-03 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Klozapin jämfört med annat antipsykotiskt läkemedel vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna med misstänkt ökad suicidrisk avseende risken för våldsamt beteende | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 10. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213. | 2020-03-05 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Antipsykotiskt läkemedel i depåform jämfört med peroral form vid svårbehandlad schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 11. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. | 2020-03-05 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|---|------------|
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Bupropion som tillägg till nikotinplåster jämfört med enbart nikotinplåster vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna | Läkemedel, Medicinteknik & Kirurgi | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 19. SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. | 2020-03-05 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Vareniklin jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende rökreduktion och rökfrihet (mätt vid längre uppföljningstid) | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 19. SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. | 2020-03-05 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Bupropion jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende rökreduktion och rökfrihet mätt vid längre uppföljningstid | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 19. SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. | 2020-03-05 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Risperidon jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 2. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213. | 2020-03-03 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Olanzapin jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 3. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213. | 2020-03-03 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|------------------------------------|--|---|---------------------------|---|------------|
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Psykodynamisk terapi (PDT) som komplement till antipsykotisk behandling jämfört med sedvanlig behandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna med kvarstående psykosymtom | Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 57. | 2020-03-06 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Haloperidol jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 6. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213. | 2020-03-04 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Zuklopentixol jämfört med andra generationens antipsykotiska läkemedel (SGA) vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 8. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. | 2020-03-05 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Zuklopentixol jämfört med första generationens antipsykotiska läkemedel (FGA) vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 8. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. | 2020-03-04 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Zuklopentixol jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 8. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. | 2020-03-04 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|------------------------------------|--|----------------|---------------------------|---|------------|
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Klozapin jämfört med andra generationens antipsykotiska läkemedel (SGA) vid svårbehandlad schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 9. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. | 2020-03-04 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Klozapin jämfört med första generationens antipsykotiska läkemedel (FGA) vid svårbehandlad schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende flera utfall | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 9. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. | 2020-03-04 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Klozapin jämfört med placebo vid svårbehandlad schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende psykiska symtom, agranulocytos, myokardit, sexuell dysfunktion, kognitiv påverkan och livskvalitet | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 9. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. | 2020-03-04 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Quetiapin jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 4. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213. | 2020-03-03 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Paliperidon jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 5. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213. | 2020-03-03 |

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|------------------------------------|--|----------------|---|--|------------|
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Ziprasidon jämfört med placebo vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna avseende kognitiv påverkan, sexuell dysfunktion, livskvalitet och långtidsuppföljningar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 7. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213. | 2020-03-04 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Behandling med akamprosat jämfört med placebo för att minska alkoholkonsumtionen hos personer med schizofreni och samtidigt beroende/missbruk av alkohol | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. ISBN 978-91-85413-90-4. | 2015-03-24 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Behandling med naltrexon jämfört med placebo för att minska alkoholkonsumtionen hos personer med schizofreni och samtidigt beroende/missbruk av alkohol | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. ISBN 978-91-85413-90-4. | 2015-03-24 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Behandling med klozapin jämfört med ziprasidon för att minska psykosymtom hos personer med schizofreni och samtidigt beroende/missbruk av cannabis | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. ISBN 978-91-85413-90-4. | 2015-03-24 |
| Schizofreni & Psykotiska tillstånd | Antipsykotiskt läkemedel i depåform jämfört med peroral form vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna med missbruk eller beroende, avseende flera utfall | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018, rad 15. SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. SBU. Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 213. | 2020-03-05 |
| Särskilda tillstånd | Könsbekräftande hormonbehandling (testosteron) vid könsdysfori hos ungdomar med tilldelat kvinnligt födelsekön | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd. Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Metodbeskrivning och kunskapsunderlag. | 2020-01-20 |

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|---|---|---|--|------------|
| Särskilda tillstånd | Könsbekräftande hormonbehandling (östroger) vid könsdysfori hos ungdomar med tilldelat manligt födelsekön | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd. Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Metodbeskrivning och kunskapsunderlag. | 2020-01-20 |
| Särskilda tillstånd | Pubertetsfördröjande hormonbehandling vid könsdysfori hos ungdomar | Diagnostik & Utredning, Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd. Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Metodbeskrivning och kunskapsunderlag. | 2020-01-20 |
| Särskilda tillstånd | Hormonell behandling vid könsdysfori hos vuxna med tilldelat manligt födelsekön som söker könsbekräftande behandling | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | Kunskapsluckan har inkommit som ett förslag till SBU. | 2020-01-27 |
| Särskilda tillstånd | Hormonell behandling vid könsdysfori hos vuxna med tilldelat kvinnligt födelsekön som söker könsbekräftande behandling | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | Kunskapsluckan har inkommit som ett förslag till SBU. | 2020-01-27 |
| Särskilda tillstånd | Viktreducerande läkemedel i kombination med självhjälp och viktredningsprogram vid hetsättningsstörning | Läkemedel, Diet & Nutrition | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1. | 2017-10-16 |
| Särskilda tillstånd | Viktreducerande läkemedel jämfört med placebo vid hetsättningsstörning | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1. | 2017-10-16 |
| Särskilda tillstånd | Stämningsstabiliserande (antikonvulsiva) läkemedel i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid hetsättningsstörning | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1. | 2017-10-16 |
| Särskilda tillstånd | Tricykliskt antidepressiva läkemedel i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid hetsättningsstörning | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1. | 2017-10-16 |
| Särskilda tillstånd | Centralstimulerande läkemedel (lisdexamfetamin) jämfört med placebo vid hetsättningsstörning avseende ätstörningsspecifik psykopatologi, depressiv symtomatologi och livskvalitet | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1. | 2017-10-11 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| Särskilda tillstånd | Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) jämfört med placebo vid hetsättningsstörning avseende ätstörningsspecifik psykopatologi, body mass index (BMI), depressiv symtomatologi och livskvalitet | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1. | 2017-10-11 |
| Särskilda tillstånd | Stämningsstabiliserande (antikonvulsiva) läkemedel jämfört med placebo vid hetsättningsstörning och samtidig fetma | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1. | 2017-10-11 |
| Särskilda tillstånd | Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid hetsättningsstörning | Läkemedel, Psykologiska & Psykoterapeutiska | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av hetsättningsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 248. ISBN 978-91-85413-91-1. | 2017-10-11 |
| Missbruk & Beroende | Oxcarbazepin jämfört med placebo vid alkoholabstinens | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C04. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Klometiazol jämfört med klorazepat vid svår alkoholabstinens (delirium tremens) avseende abstinenssymtom | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C12. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Gabapentin jämfört med placebo vid alkoholabstinens | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C04. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Valproat jämfört med placebo respektive bensodiazepiner vid alkoholabstinens | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C04. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Karbamazepin jämfört med placebo vid alkoholabstinens | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C03. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Klometiazol jämfört med placebo respektive bensodiazepiner vid alkoholabstinens med risk för abstinensepilepsi och delirium tremens avseende abstinensepilepsi | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C08. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Baklofen vid alkoholberoende avseende fri från tungt drickande och andel nyktra dagar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (översyn 2019), rad C20. | 2019-12-06 |
| Missbruk & Beroende | Gabapentin jämfört med placebo vid alkoholberoende avseende långtidseffekter | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C23. | 2019-12-06 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|---|------------|
| Missbruk & Beroende | Paroxetin jämfört med placebo vid alkoholberoende med samtidig social fobi avseende andel tunga dryckesdagar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad F02. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Läkemedelsbehandling av aggressivitet, agitation samt kraftigt sympatikuspåslag vid amfetamintoxikation | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av aggressivitet och agitation vid psykos. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU:s upplysningstjänst, publicerad 2015-10-05. | 2016-08-08 |
| Missbruk & Beroende | Mirtazapin vid amfetaminberoende | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C27. | 2019-12-19 |
| Missbruk & Beroende | Insatser för att förebygga användning av dopningspreparat hos barn, ungdomar och unga vuxna | Prevention, Levnadsvanor, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 243. ISBN 978-91-85413-87-4. | 2016-04-21 |
| Missbruk & Beroende | Insatser för att förebygga missbruk av läkemedel hos barn, ungdomar och unga vuxna | Prevention, Levnadsvanor, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 243. ISBN 978-91-85413-87-4. | 2016-04-21 |
| Missbruk & Beroende | Disulfiram vid kokainberoende | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C33. | 2019-12-06 |
| Missbruk & Beroende | Bensodiazepinnedtrappning jämfört med placebo vid långvarigt bruk av bensodiazepiner där utsättning på sedvanligt sätt inte varit möjligt | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C24. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Flumazenil jämfört med enbart nedtrappning vid långvarigt bruk av bensodiazepiner i hög dos där utsättning på sedvanligt sätt inte varit möjligt | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C25. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Utandningsprov vid befarat pågående eller nyligt intag av narkotika | Diagnostik & Utredning, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad B11. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Klonidin jämfört med metadon vid opiatabstinens (heroinberoende) avseende andel patienter som avbryter behandlingen på grund av biverkningar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C36. | 2016-10-18 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|--|----------------|---------------------------|--|------------|
| Missbruk & Beroende | Buprenorfin jämfört med clonidin vid opiatabstinens (heroinberoende) avseende andel patienter med biverkningar samt antal patienter som avbryter behandlingen på grund av biverkningar | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och Stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C35. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Antidepressiva läkemedel vid opiatberoende och samtidig depression | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och Stöd vid missbruk och beroende 2015, rad F09. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Nedtrappning vid opioidanalgetikaberoende | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och Stöd vid missbruk och beroende 2015, rad C42. | 2016-10-18 |
| Missbruk & Beroende | Naltrexon i injektionsform vid opioidberoende avseende andel drogfria veckor | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och Stöd vid missbruk och beroende (översyn 2019), rad C39b. | 2019-12-19 |
| Missbruk & Beroende | Paroxetin jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. | 2020-05-29 |
| Missbruk & Beroende | Topiramamat jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. | 2020-05-28 |
| Missbruk & Beroende | Naltrexon jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. | 2020-05-28 |
| Missbruk & Beroende | Olanzapin jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. | 2020-05-28 |
| Missbruk & Beroende | Baklofen jämfört med akamprosamat vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. | 2020-05-27 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|--|----------------|---------------------------|--|------------|
| Missbruk & Beroende | Bupropion SR jämfört med naltrexon vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. | 2020-05-27 |
| Missbruk & Beroende | Litium jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) och bipolärt syndrom II eller UNS | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. | 2020-05-27 |
| Missbruk & Beroende | Nalmefen jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. | 2020-05-27 |
| Missbruk & Beroende | Amantadin jämfört med placebo vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. | 2020-05-27 |
| Missbruk & Beroende | Litium jämfört med valproat vid beroende av spel om pengar (hasardspelssyndrom) | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. | 2020-05-27 |
| Demens & Äldre | Kolinesterashämmare jämfört med placebo vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom avseende död, livskvalitet och tid till vårdhemsplacering | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 56A. | 2018-10-18 |
| Demens & Äldre | Kolinesterashämmare jämfört med placebo vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom med cerebrovasculära inslag avseende död, livskvalitet och tid till vårdhemsplacering | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 56B. | 2018-10-18 |
| Demens & Äldre | Memantin i kombination med kolinesterashämmare jämfört med memantin som monoterapi vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 60. | 2018-10-18 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|--|----------------|---------------------------|---|------------|
| Demens & Äldre | Första generationens antipsykotiska läkemedel vid demenssjukdom och kvarvarande psykotiska symtom efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 72A. | 2018-10-19 |
| Demens & Äldre | Aripiprazol jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande aggressivitet efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73B. | 2018-10-22 |
| Demens & Äldre | Kvetiapin jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande aggressivitet efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73B. | 2018-10-23 |
| Demens & Äldre | Olanzapin jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande aggressivitet efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73B. | 2018-10-23 |
| Demens & Äldre | Risperidon jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande aggressivitet efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73B. | 2018-10-23 |
| Demens & Äldre | Klometiazol till natten vid demenssjukdom och beteendemässiga och psykiska symtom och sömnstörningar jämfört med frånvaro av åtgärden | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 76. | 2018-10-23 |

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|--|----------------|---------------------------|---|------------|
| Demens & Äldre | Mirtazapin vid demenssjukdom och samtidig depression jämfört med frånvaro av åtgärden | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 79. | 2018-10-23 |
| Demens & Äldre | Risperidon vid demenssjukdom och kvarvarande konfusion efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling jämfört med frånvaro av åtgärden | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 80. | 2018-10-23 |
| Demens & Äldre | Haloperidol vid demenssjukdom och kvarvarande konfusion efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling jämfört med frånvaro av åtgärden | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 80. | 2018-10-23 |
| Demens & Äldre | Klometiazol till natten vid demenssjukdom och kvarvarande konfusion och samtidig sömnstörning efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling jämfört med frånvaro av åtgärden | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 81. | 2018-10-24 |
| Demens & Äldre | Kvetiapin jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande psykotiska symtom efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73A. | 2018-10-22 |
| Demens & Äldre | Olanzapin jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande psykotiska symtom efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73A. | 2018-10-22 |

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|--|---|--------------------------------|---|------------|
| Demens & Äldre | Risperidon jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande psykotiska symtom efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73A. | 2018-10-22 |
| Demens & Äldre | Aripiprazol jämfört med placebo vid demenssjukdom och kvarvarande psykotiska symtom efter utredning av bakomliggande orsaker och icke-farmakologisk behandling avseende effekter och biverkningar vid långtidsanvändning | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 73A. | 2018-10-19 |
| Demens & Äldre | Oxazepam vid demenssjukdom med uttalad ångest och orostillstånd jämfört med frånvaro av åtgärden | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 75. | 2018-10-23 |
| Demens & Äldre | Antidepressiva läkemedel (SSRI-preparat) vid frontotemporal demenssjukdom och samtidig depression jämfört med frånvaro av åtgärden | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 67. | 2018-10-19 |
| Demens & Äldre | Galantamin vid Lewykroppsdemens | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 91. | 2018-10-25 |
| Demens & Äldre | Memantin jämfört med placebo vid Lewykroppsdemens avseende kognitiv funktion och ADL-funktion | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 92. | 2018-10-25 |
| Övrig psykisk hälsa | Melatonin till barn som har flera funktionsnedsättningar och sömnproblem | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | | 2013-11-04 |
| Övrig psykisk hälsa | Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel vid daglig rökning hos vuxna med särskild risk | Prevention, Stöd & Information, Levnadsvanor, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018, rad 23. | 2019-03-20 |
| Övrig psykisk hälsa | Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning (vareniklin, bupropion) vid daglig rökning hos vuxna med särskild risk | Prevention, Stöd & Information, Levnadsvanor, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018, rad 24. | 2019-03-21 |

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|---|---|---|---|------------|
| Övrig psykisk hälsa | Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel vid daglig snusning hos vuxna med särskild risk | Prevention, Stöd & Information, Läkemedel, Levnadsvanor | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018, rad 26. | 2019-03-21 |
| Övrig psykisk hälsa | Rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för snusavvänjning (vareniklin) vid daglig snusning hos vuxna med särskild risk | Prevention, Stöd & Information, Levnadsvanor, Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018, rad 27. | 2019-03-21 |
| Övrig psykisk hälsa | Risperidon jämfört med annat antipsykotiskt läkemedel vid behandling av personer i rättspsykiatrisk vård | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 286. ISBN 978-91-88437-28-0. | 2018-12-10 |
| Övrig psykisk hälsa | Klozapin jämfört med annat antipsykotiskt läkemedel vid behandling av personer i rättspsykiatrisk vård | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 286. ISBN 978-91-88437-28-0. | 2018-11-30 |
| Övrig psykisk hälsa | Litium som tillägg till antipsykotisk läkemedelsbehandling jämfört med endast antipsykotisk läkemedelsbehandling för personer i rättspsykiatrisk vård | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 286. ISBN 978-91-88437-28-0. | 2018-11-30 |
| Övrig psykisk hälsa | Quetiapin jämfört med olanzapin vid behandling av personer i rättspsykiatrisk vård | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 286. ISBN 978-91-88437-28-0. | 2018-11-30 |
| Övrig psykisk hälsa | Högdosbehandling med traditionella antipsykotiska läkemedel jämfört med normaldosering vid behandling av personer i rättspsykiatrisk vård | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 286. ISBN 978-91-88437-28-0. | 2018-11-23 |
| Övrig psykisk hälsa | Antidepressiva läkemedel vid behandling av sömnbesvär | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5. | 2014-06-25 |

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|---------------------|--|----------------|---|---|------------|
| Övrig psykisk hälsa | Antihistaminer vid behandling av sömnbesvär | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5. | 2014-06-27 |
| Övrig psykisk hälsa | Flunitrazepam vid behandling av sömnbesvär | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5. | 2014-06-27 |
| Övrig psykisk hälsa | Propiomazin vid behandling av sömnbesvär | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5. | 2014-06-27 |
| Övrig psykisk hälsa | Nitrazepam vid behandling av sömnbesvär | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5. | 2014-07-09 |
| Övrig psykisk hälsa | Alimemazin vid behandling av sömnbesvär | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5. | 2010-11-02 |
| Övrig psykisk hälsa | Flunitrazepam vid sömnproblem hos barn | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | | 2013-11-04 |
| Övrig psykisk hälsa | Klometiazol vid sömnproblem hos barn | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | | 2013-11-04 |
| Övrig psykisk hälsa | Nitrazepam för barn med sömnproblem | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | | 2013-11-04 |
| Övrig psykisk hälsa | Propiomazin för barn med sömnproblem | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | | 2013-11-04 |
| Övrig psykisk hälsa | Triazolam för barn med sömnproblem | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | | 2013-11-04 |
| Övrig psykisk hälsa | Zolpidem för barn med sömnproblem | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | | 2013-11-04 |
| Övrig psykisk hälsa | Zopiklon för barn med sömnproblem | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | | 2013-11-04 |
| Övrig psykisk hälsa | Melatonin för i övrigt friska barn med sömnproblem | Läkemedel | En systematisk översikt behövs | | 2013-11-04 |

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335

| Populationskategori | Titel | Insatskategori | Typ av kunskapslucka | Referens | Datum |
|------------------------------------|--|---|---|---|------------|
| Övrig psykisk hälsa | Zaleplon 10 mg vid behandling av sömnbesvär som pågår längre tid än fyra veckor | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5. | 2014-07-07 |
| Övrig psykisk hälsa | Zolpidem 10 mg vid behandling av sömnbesvär som pågår längre tid än fyra veckor | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5. | 2014-07-08 |
| Övrig psykisk hälsa | Zopiklon 7,5 mg vid behandling av sömnbesvär som pågår längre tid än fyra veckor | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5. | 2014-07-08 |
| Övrig psykisk hälsa | Triazolam 0,5 mg vid behandling av sömnbesvär som pågår längre tid än fyra veckor | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 199. ISBN 978-91-85413-35-5. | 2014-07-09 |
| Övrig psykisk hälsa | Selektiva serotoninåterupptagshämmande läkemedel (SSRI) hos vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2011. SBU-rapport nr 207. ISBN 978-91-85413-43-0. | 2014-07-18 |
| Övrig psykisk hälsa | Kriminalvårdens behandlingsprogram (ROS) för vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn | Psykologiska & Psykoterapeutiska, Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2011. SBU-rapport nr 207. ISBN 978-91-85413-43-0. | 2014-07-18 |
| Övrig psykisk hälsa | Testosterondämpande läkemedel hos vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn | Läkemedel | En uppdaterad systematisk översikt behövs | SBU. Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Stockholms beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2011. SBU-report no. 207. ISBN 978-91-85413-43-0. | 2014-07-18 |
| Somatiska tillstånd | Reboxetin jämfört med placebo vid depression efter stroke hos personer över 65 år | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 233. ISBN 978-91-85413-76-8. | 2015-03-25 |
| Intellektuell funktionsnedsättning | Kolinesterashämmare jämfört med placebo vid försämrad kognitiv funktion vid Downs syndrom avseende dödlighet, vårdbehov och vårdarens stress | Läkemedel | Fler primärstudier behövs | Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017, rad 66. | 2018-10-18 |

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder
www.sbu.se/335