

Rapport: Diagnostik av äggstockscancer SBU 2024/129

Plats	Stod	Ska stå	Korrigeringsdatum
11.1.2 Kansli	–	Lotta Ryk, medverkande projektledare	2025-12-17
Sammanfattning, Huvudbudskap, andra stycket	Forskning visar att den diagnostiska tillförlitligheten hos de i Sverige ofta använda metoderna SR och PR framstår som <u>likvärdig</u> med flertalet av de övriga metoderna.	Forskning visar att den diagnostiska tillförlitligheten hos de i Sverige ofta använda metoderna SR och PR inte kan särskiljas från flertalet av de övriga metoderna.	2025-12-17
Sammanfattning, Slutsatser, andra punkten	Hos kvinnor efter klimakteriet (postmenopaus) är den diagnostiska tillförlitligheten vid misstänkt äggstockscancer hög och <u>likvärdig</u> för fem metoder – SR, PR, RMI, ROMA och ADNEX.	Hos kvinnor efter klimakteriet (postmenopaus) är den diagnostiska tillförlitligheten vid misstänkt äggstockscancer hög och för de fem metoderna – SR, PR, RMI, ROMA och ADNEX – kan den diagnostiska tillförlitligheten inte särskiljas.	2025-12-17
6.1 ADNEX:, första punkten	punktestimatet för sensitivitet var <u>likvärdigt</u> högt i förhållande till de övriga men hade en lägre specificitet	punktestimatet för sensitivitet var högt och kunde inte särskiljas från övrigas, men hade en lägre specificitet (större	2025-12-17

	(större andel falskt positiva resultat),	andel falskt positiva resultat),	
6.1 LR2:, första punkten	punktestimatet för sensitivitet var <u>likvärdigt</u> med de övriga och specificiteten var i samma storleksordning som för ADNEX.	punktestimatet för sensitivitet kunde inte särskiljas från de övrigas och specificiteten var i samma storleksordning som för ADNEX.	2025-12-17
6.5 Sammanfattning av de indirekta jämförelserna för den postmenopausala gruppen, tredje stycket under figur 6.26, tredje meningen	ADNEX och LR2 har båda ett uppmätt punktestimat för sensitivitet som är <u>likvärdigt</u> högt i förhållande de övrigas men en lägre specificitet.	ADNEX och LR2 har båda ett uppmätt punktestimat för sensitivitet som är på samma höga nivå i förhållande till övrigas, men med en lägre specificitet.	2025-12-17
9.1 Resultatdiskussion, tredje stycket fjärde meningen	ADNEX och LR2 hade båda ett punktestimat för sensitivitet som är <u>likvärdigt</u> de övrigas, men lägre specificitet.	ADNEX och LR2 hade båda ett punktestimat för sensitivitet som är på samma höga nivå i förhållande till de övriga, men lägre specificitet.	2025-12-17